

Nr. 012 /O/20.04.2023

BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Răpăn T1** (*Venturia inaequalis*, *V. pirina*), **Făinare T2** (*Podospaera leucotricha*), **Foc bacterian** (*Erwinia amylovora*), **Păduche lănos** (*Eriosoma l.*), **Molia cojii fructelor** (*Adoxophyes reticulana*) – larve hibernante, purici meliferi, aflde.

Care poate/pot cauza pierderi importante la culturile:

MĂR, PĂR

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: Tratament obligatoriu înainte de înflorit

Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

- 1. Polyram DF = 2,5 kg/ha + Kumulus DF = 3 kg/ha + Mospilan 20 SG = 0,250 kg/ha sau**
- 2. Alcupral 50 PU = 2 - 3 kg/ha + Sulfolac 80 WG = 3 kg/ha + Mospilan 20 SG = 0,250 kg/ha sau**
- 3. Sercadis = 0,25 l/ha + Mospilan 20 SG = 0,250 kg/ha.**

Perioada optimă de tratament: ” răsfirarea inflorescenței - înfoierea corolei” (înainte de înflorit).

În livezile unde s-a manifestat Focul bacterian al rozaceelor (*Erwinia amylovora*) recomandăm efectuarea tratamentelor cu produse cuprice.

Alte recomandări:

- instalarea capcanelor cu feromoni de sinteză pentru: AtraPOM, AtraMOL, AtraBLANC, AtraRET, Atra SCIT, atraPERN - pentru stabilirea curbei de zbor ale moliilor miniere, viermelui merelor, moliei pielței fructelor, San José;
- **Atenție! In cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.**
- Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor:**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării/ fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumel pers.responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/ dăunători/ buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Supra-fața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare

Dr. Ing. Carmen Miroiu


