

BULETIN DE AVERTIZARE

Oficiul Fitosanitar Vaslui recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare împotriva: **Musca cireșelor T1+T2** (*Rhagoletis c.*), **Monilioza sâmburoaselor** (*Monilinia l.*), **Antracnoza frunzelor de cires** (*Coccomyces hiemalis*), care poate/pot cauza pierderi importante la culturile: **cires, vișin**

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului: **preventiv pentru musca cireșelor** numai pe parcelele pe care s-au realizat următoarele condiții: PED vierme = 10 fructe atacate/pom în anul anterior
Folosiți unul din produsele sau din amestecurile de mai jos, după caz:

1. **Expirel = 05 – 09 l/ha + Teldor 500 SC = 0,8 l/ha sau**
2. **Deltagri (Faster Delta) = 0,25 – 0,3 l/ha + Signum (Syrex Star) = 0,5 kg/ha.**

Perioada optimă de tratament: intrarea în pârgă a soiurilor cu coacere târzie și foarte târzie.

- **După 8 – 10 zile se execută tratamentul 2 cu un insecticid din altă grupă chimică.**
- **Tratamentul nu se aplică la soiurile cu coacere timpurie.**

Alte recomandări:

- **Atenție!** În cazul tratamentelor complexate efectuați în prealabil testul de compatibilitate.
- Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Clătiți ambalajele produselor de trei ori și goliți apa de clătire în cuva. Aplicați pe parcela tratată restul de soluție rămasă diluată cu apa de clătire;
- **Agricultorii** care prin activitatea lor depozitează, manipulează și utilizează produse de protecție a plantelor au următoarele **obligatii:**

1. Să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.
2. Să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.
3. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin **autorizație** pentru utilizarea acestor produse.
4. Să nu aplice tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii.
5. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațile agricole, așa cum sunt prevăzute în "**Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor**" - emis de Autoritatea Națională Fitosanitară;
6. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și **registru de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, conform modelului:**

Data efectuării tratam. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața ha	Cantități utilizate (kg, l)			

7. Pentru protecția familiilor de albine respectați Ordinul comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și Legea apiculturii nr. 383/2013.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Dr. Ing. Carmen Miroiu


